

Ago-aspirato Tiroideo:

Preparazione ad Esame di Ago-Aspirazione Eco-Guidata Tiroidea per Esame Citologico

Se si assume **terapia anticoagulante** (acenocumarolo : Sintrom, wafarin: Coumadin) rivolgersi al centro TAO di riferimento o allo specialista cardiologo per la sostituzione del farmaco con eparina a basso peso molecolare.

Se si assumono **anticoagulanti di nuova generazione** (Dabigatran, Rivoxaban, Apixaban) non vi sono motivi fondati per sospendere la terapia. Ame news nr.49 - Luglio 2015.

Se si è in **trattamento con farmaci anti-aggreganti:** Acidoacetilsalicilico (Cardioaspirin) non sospendere; Ibuprofene (Ibustrin), ticlopidina (Tiklid) , clopidogrel (Plavix) sospendere almeno 5 giorni prima dell'esame.

Prasugrel (Efient) sospendere 7 giorni prima.

Ticagrelor (Brilique) sospendere almeno 3 giorni prima dell'esame.

La terapia potrà essere ripristinata dopo 1-4 giorni dall'esame.

Il giorno dell'esame non è necessario essere digiuni.

Portare la documentazione sanitaria in possesso (ecografia, scintigrafia, analisi) e la richiesta specialistica dell'esame.