

Colonscopia

Il paziente deve stare a digiuno (compresi tutti i liquidi) dalle 24:00 del giorno precedente all'esame diagnostico

Nei 2 giorni che precedono la colonscopia, non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti integrali.

Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso).

La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina).

Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di moviprep® gusto arancio e fino all'esecuzione della colonscopia.

Non assumere altri medicinali per via orale da almeno un'ora prima di assumere Moviprep® gusto arancio ad almeno un'ora dopo in quanto possono essere eliminati attraverso l'apparato digerente e non agire come dovrebbero.

Se si stanno assumendo farmaci, chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione (Es. Farmaci anticoagulanti come sintrom e coumadin).

Attenzione: non assumere Moviprep gusto arancio in caso di fenilchetonuria (a causa della presenza di aspartame) o di carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (a causa della presenza di ascorbato).

Un ciclo di trattamento comporta l'assunzione di 2 litri di Moviprep® gusto arancio.

Un litro di moviprep® gusto arancio è costituito da una bustina a e una bustina b: versare in una caraffa l'intero contenuto della bustina A e l'intero contenuto della bustina B.

Aggiungere 1 litro d'acqua e mescolare fino al completo scioglimento della polvere.

La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di 1 ora. L'assunzione va ripetuta con un secondo litro di Moviprep® gusto Arancio.

Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti, elenco delle medicine che si stanno assumendo, ed il referto di un elettrocardiogramma eseguito negli ultimi 3 mesi.

Il paziente deve essere accompagnato e, dopo l'esame, non potrà guidare alcun veicolo.

Modalita' di assunzione

Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di moviprep gusto arancio tra le 18:30 e le 19:30 e, successivamente, fare una cena liquida a base di brodo senza pastina.

Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio tra le 21:30 e le 22:30 e successivamente bere 1 litro di acqua è anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla)

Si deve assumere tutto il prodotto (Moviprep + liquidi chiari) per poter eseguire un esame corretto. - l'eventuale comparsa di nausea non è un fenomeno preoccupante.

Durante l'assunzione del preparato e fino al termine dell'esame non è concesso mangiare cibi solidi.

N.B. Comunicare immediatamente eventuali patologie croniche importanti, allergie/intolleranze al lattice direttamente al prof nudo al n°06215921

La terapia antipertensiva non va sospesa.