

Ago-aspirato Tiroideo:

Preparazione ad esame di ago-aspirazione eco-guidata tiroidea per esame citologico

Se si assume terapia anticoagulante (acenocumarolo: *Sintrom*, wafarin: *Coumadin*) rivolgersi al centro TAO di riferimento o allo specialista cardiologo per la sostituzione del farmaco con eparina a basso peso molecolare.

Se si assumono anticoagulanti di nuova generazione (Dabigatran, Rivoxaban, Apixaban) non vi sono motivi fondati per sospendere la terapia. (Thyroid Apr.25-4-2015)

Se si è in trattamento con farmaci anti-aggreganti: Acidoacetilsalicilico (*Cardioaspirin*), Ibuprofene (*Ibustrin*), ticlopidina (*Tiklid*), clopidogrel (*Plavix*) sospendere almeno 3 giorni prima dell'esame e fino a 3 giorni dopo.

Prasugrel (*Efient*) sospendere 7 giorni prima.

Ticagrelor (*Brilique*) sospendere almeno 3 giorni prima dell'esame.

La terapia potrà essere ripristinata dopo 1-4 giorni dall'esame.

Il giorno dell'esame non è necessario essere digiuni.

Portare la documentazione sanitaria in possesso (ecografia, scintigrafia, analisi) e la richiesta specialistica dell'esame.