

Colonscopia con sedazione

Il paziente deve stare a digiuno (compresi tutti i liquidi) dalla mezzanotte della giornata di esecuzione dell'esame.

Nei 2 giorni che precedono la colonscopia, non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti integrali.

Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso).

La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina).

Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di moviprep® gusto arancio e fino all'esecuzione della colonscopia.

Non assumere altri medicinali per via orale da almeno un'ora prima di assumere Moviprep® gusto arancio ad almeno un'ora dopo in quanto possono essere eliminati attraverso l'apparato digerente e non agire come dovrebbero.

Se si stanno assumendo farmaci, chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione (Es. Farmaci anticoagulanti come sintrom e coumadin).

Attenzione: non assumere Moviprep gusto arancio in caso di fenilchetonuria (a causa della presenza di aspartame) o di carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (a causa della presenza di ascorbato).

Un ciclo di trattamento comporta l'assunzione di 2 litri di Moviprep® gusto arancio.

Un litro di moviprep® gusto arancio è costituito da una bustina a e una bustina b: versare in una caraffa l'intero contenuto della bustina A e l'intero contenuto della bustina B.

Aggiungere 1 litro d'acqua e mescolare fino al completo scioglimento della polvere.

La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di 1 ora. L'assunzione va ripetuta con un secondo litro di Moviprep® gusto Arancio.

Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti, elenco delle medicine che si stanno assumendo, ed il referto di un elettrocardiogramma eseguito negli ultimi 3 mesi.

Il paziente deve essere accompagnato e, dopo l'esame, non potrà guidare alcun veicolo.

Modalita' di assunzione

Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di moviprep gusto arancio tra le 18:30 e le 19:30 e, successivamente, fare una cena liquida a base di brodo senza pasta.

Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio tra le 21:30 e le 22:30 e successivamente bere 1 litro di acqua è anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla)

Si deve assumere tutto il prodotto (Moviprep + liquidi chiari) per poter eseguire un esame corretto. - l'eventuale comparsa di nausea non è un fenomeno preoccupante.

Durante l'assunzione del preparato e fino al termine dell'esame non è concesso mangiare cibi solidi.

N.B. Comunicare immediatamente eventuali patologie croniche importanti, allergie/intolleranze al lattice direttamente al prof Nudo al numero 06215921

La terapia antipertensiva non va sospesa.

Alla fine della procedura verrà consegnato un referto con la descrizione dettagliata dell'esame endoscopico eseguito.

Eventuale documentazione fotografica verrà acclusa solo nel caso venga riscontrata una significativa patologia all'interno del tratto esaminato.