

Isterosalpingografia

1. L' esame, a flusso mestruale cessato, va eseguito non oltre il 12° giorno del ciclo (meglio se tra il 6° ed il 12° giorno);
2. Nei due giorni che precedono l'esame fare uso di un blando lassativo;
3. La sera precedente e la mattina prima dell'esame, mettere una supposta di blando antispastico. Qualora l'esame venga eseguito dopo le ore 14, i farmaci antispastici vanno assunti rispettivamente alle ore 12 e subito prima dell'indagine;
4. La paziente, il giorno dell'esame, deve portare:
 - L'esito di un test di gravidanza (beta h.C.G su sangue) non antecedente ai 2-3 giorni prima dell'esame;
 - I seguenti esami di laboratorio (non antecedenti ai 20 giorni prima dell'esame)
 - Azotemia
 - Glicemia
 - Creatininemia
 - Elettroforesi proteica
 - Esame della flora vaginale effettuato poco prima dell'ultimo ciclo per ricerca di: germi comuni- clamydia- trycomonas - mycoplasma - gardnerella.

N.B. In caso di positività ad uno degli agenti patogeni occorre rivolgersi al proprio ginecologo per l'eventuale terapia da effettuare prima dell'esecuzione dell'esame che dovrà essere riprogrammato a negatività accertate si ricorda gentilmente di disdire la precedente prenotazione.

- È assolutamente necessario il consenso informato firmato sul modulo apposito.
- Il paziente deve inoltre fare una terapia antibiotica ad ampio spettro (Zytromax), iniziare 24 ore prima dell'esame e continuare per altri 2 giorni dopo l'esame.

- Astenersi da rapporti non protetti fino alla prossima ovulazione.

- È consigliabile il digiuno almeno 6 ore prima dell'esecuzione dell'esame.

N.B. La non osservanza anche di una sola delle norme precedentemente citate, potrebbe rendere inutile l'indagine.

Si raccomanda di portare in visione tutta la documentazione di eventuali esami precedenti.