

	ISTRUZIONI RACCOLTA URINE PER URINOCOLTURA	„ LAB “ - IST 9
		REV. 4 - 2022
		Pag. 1di 1

1. Modalità di raccolta e conservazione

Il campione raccomandato è il mitto intermedio della prima minzione del mattino, ottenuto dopo pulizia dei genitali

I contenitori della raccolta, costituiti da recipienti sterili monouso, sono acquistabili in farmacia.

Qualora si prevedono ritardi nell'esecuzione dell'esame superiori a 4 ore dalla raccolta, è necessario refrigerarlo (+4°/8°C)

La raccolta va eseguita seguendo alcuni piccoli accorgimenti:

- Non fare sforzi fisici ed astenersi dai rapporti sessuali nelle 12 ore antecedenti la raccolta
- Osservare il digiuno dalla mezzanotte
- far precedere la raccolta dell'urina da un'accurata pulizia dei genitali utilizzando un sapone non antisettico ed abbondante acqua per il risciacquo
- eliminare il primo mitto, raccogliendo il mitto intermedio in un contenitore a bocca larga, sterile, evitando contatti tra contenitore e genitali
- raccogliere almeno 15-30 ml di urina
- chiudere ermeticamente il contenitore ed inviarlo al laboratorio nel più breve tempo possibile
- etichettare il campione con dati anagrafici (l'etichetta non va applicata sul coperchio)
- segnalare eventuali patologie o interventi urologici maggiori
- in presenza di urine con pigmenti anomali segnalare l'assunzione di farmaci o alimenti particolari.

Nel caso in cui la raccolta avvenga mediante [catetere vescicale a permanenza](#):

- clampare il tubo di drenaggio delle urine un'ora prima del prelievo
- pulire esternamente il catetere con alcool
- disinfettare il punto dove si effettuerà il prelievo
- sterilmente aspirare con ago e siringa le urine presenti nel lume del catetere
- inserire le urine nel contenitore sterile

N.B. non prelevare le urine dal sacchetto di raccolta

Raccolta con sacchetto di plastica: Questa metodica viene utilizzata per neonati o pazienti incontinenti

Il sacchetto sterile da applicare sui genitali dopo un accurato lavaggio locale.

Per la facilità di contaminazione fecale non lasciare in situ, entro mezz'ora staccare il sacchetto e consegnarlo in laboratorio.

Se il paziente ha difficoltà ad urinare, procedere alla sostituzione dello stesso ogni 30 minuti dopo aver ripetuto la detersione.

Il laboratorio valuterà l'idoneità del campione, in caso può chiedere l'invio di un nuovo campione.

Riferimenti: linee guida SiBioc

REV	Data emissione	N° pag.	Causale preparazione Modifica documento	Redazione		Approvazione		Validazione	
				<i>Funz.</i>	<i>Firma</i>	<i>Funz.</i>	<i>Firma</i>	<i>Funz.</i>	<i>Firma</i>
3	2018	1	Revisione	<i>Rcq</i>		<i>Ruo</i>		<i>RUO</i>	
4	11/11/2022	1	AGGIORNAMENTO GENERALE	<i>RCQ</i>		<i>RUO</i>		<i>RUO</i>	